

REPERER LES SYMPTÔMES DE JAUNISSES

Le terme de "jaunisses" regroupe deux maladies : le bois noir et la flavescence dorée. Seul un test moléculaire de dépistage au laboratoire permet de les différencier. A la parcelle, visuellement, il est impossible d'y parvenir. D'où la nécessité de prélever tout cep douteux pour analyse. Toutes les parcelles doivent être surveillées et, en priorité, les jeunes plantations et entreplantations.

Marche à suivre

En cas de détection d'un cep douteux, repérer le cep (ruban ou bombe fluorescente) puis deux possibilités :

- utiliser l'application VigICA (disponible sur Android et iOS) pour le géolocaliser et pour transmettre l'information
- ou envoyer un plan :
 - Région Grand Est : DRAAF-SRAL Grand Est, I. Riou (isabelle.riou@agriculture.gouv.fr) ou Fredon Grand Est, C. Gisbert (christine.gisbert@fredon-grandest.fr).
 - Région Hauts-de-France : DRAAF-SRAL Hauts-de-France, B. Charon (benedicte.charon@agriculture.gouv.).

Tout cep douteux confirmé "jaunisses" par un technicien fera l'objet d'un prélèvement pour diagnostic au laboratoire.

SYMPTÔMES DE JAUNISSES

Au niveau
des grappes



Au niveau
des feuilles



Au niveau
des rameaux



IMPORTANT : au niveau du cep, les symptômes de jaunisses peuvent s'exprimer sur l'ensemble du pied ou ne concerner qu'1 ou 2 rameaux (cas rencontré régulièrement).


Symptômes de jaunisses

Non aoûté des bois, port retombant, rameaux avec aspect caoutchouteux jusqu'à la base. Possible coloration brune sur 1 côté (face soleil couchant).

Feuilles enroulées et colorées en rouge (pour les noirs) ou en jaune (pour les blancs). Epaissement du limbe lui donnant une texture craquante.

Nervures des feuilles colorées en rouge (pour les noirs) ou en jaune (pour les blancs). Pour les cépages blancs, symptômes non systématiques.

Flétrissement des baies (pas ou très peu de récolte).



A NE PAS CONFONDRE AVEC...

Symptômes de l'enroulement

Aoûté des bois généralement correct. Cas possible d'aoûté incomplet si la charge est importante et l'année tardive.

Feuilles enroulées et colorées (en rouge ou jaune selon cépage).

Nervures des feuilles vertes.

Aspect normal des grappes, retard de maturation fréquent.



Symptômes liés à la cicadelle bubale

Présence d'une incision annulaire sur le rameau, plus rarement rencontrée sur le pétiole.

Au-dessus
de
l'incision

Enroulement des feuilles avec décoloration du limbe et des nervures, défaut d'aoûté du rameau.

Sous
l'incision

Pas de symptômes particuliers, aspect normal des feuilles, rameaux et grappes.

